

# FICHE TECHNIQUE ABATTANTS WC

## Produit prêt à l'emploi.

Marque : ECONETO

Référence : SW1ABAT5001

### Nettoyant désinfectant pour abattant WC

Produit désinfectant prêt à l'emploi formulé à base d'alcool. Sa composition comprend 98 % d'ingrédients d'origine minérale ou végétale.



## Caractéristiques

- Formule hydro-alcoolique à séchage rapide
- Désinfection rapide des abattants WC et surfaces sanitaires
- Produit prêt à l'emploi
- Ne laisse pas de résidus visibles après application
- Convient aux surfaces fréquemment touchées dans les sanitaires
- Participe au maintien d'une hygiène optimale dans les espaces sanitaires
- Contribue à limiter les odeurs résiduelles

## Normes de désinfection

- Produit conforme aux normes suivantes :
- EN 14476 + A2, EN 13624, EN 13727, EN 1276, EN 13697, EN 1650.

## Caractéristiques Physico-Chimiques

- Aspect : Liquide incolore
- Ph : 8
- Densité : 0,86
- Teneur alcool : supérieure à 72 %

## Mode d'emploi

### Produit prêt à l'emploi

**Vaporiser directement sur l'abattant WC ou la surface à traiter**

**Répartir uniformément si nécessaire**

**Laisser agir selon le temps de contact recommandé en fonction de la désinfection recherchée**

**Essuyer si nécessaire ou laisser sécher naturellement**

**Sans rinçage**

## Précautions d'emploi

Utiliser les biocides avec précaution

Lire la fiche de données de sécurité avant utilisation

Conserver à l'écart des sources de chaleur

Tenir hors de portée des enfants

Fiche de sécurité : <https://www.swoax.com/srcft-sw1abat5001.pdf>

## Conditionnement

Spray de 500 ml

Tête de pulvérisation bi-position (mousse / spray)

## Biocides

### Bactericide selon la norme EN 1276 : nombre de cellules viables (Na) en 5 min a 20 C (condition de proprete)

| Germes                            | Suspension d'essai N  | Temps | Na 100% | Na 94.3% | Na 0.1% |
|-----------------------------------|-----------------------|-------|---------|----------|---------|
| Staphylococcus aureus ATCC 6538   | 3,6 x 10 <sup>8</sup> | 5 min | <140    | <140     | >1650   |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 | 2,2 x 10 <sup>8</sup> | 5 min | <140    | <140     | >1650   |
| Escherichia coli ATCC 10536       | 2,4 x 10 <sup>8</sup> | 5 min | <140    | <140     | >1650   |
| Enterococcus hirae ATCC 10541     | 2,4 x 10 <sup>8</sup> | 5 min | <140    | <140     | >1650   |

### Bactericide selon la norme EN 1276 : taux de reduction (Log R = Log N0 - Log Na)

| Germes                            | Temps | 100% | 94.3% | 0.1% |
|-----------------------------------|-------|------|-------|------|
| Staphylococcus aureus ATCC 6538   | 5 min | >5.4 | >5.4  | <4.3 |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 | 5 min | >5.2 | >5.2  | <4.1 |
| Escherichia coli ATCC 10536       | 5 min | >5.2 | >5.2  | <4.2 |
| Enterococcus hirae ATCC 10541     | 5 min | >5.2 | >5.2  | <4.2 |

### Levuricide selon la norme EN 1650 : nombre de cellules viables (Na) en 15 min a 20 C (condition de proprete)

| Germes                              | Suspension d'essai N  | Temps  | Na 100% | Na 94.3% | Na 0.1% |
|-------------------------------------|-----------------------|--------|---------|----------|---------|
| Candida albicans ATCC 10231         | 1,5 x 10 <sup>7</sup> | 15 min | <140    | <140     | >1650   |
| Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 | 1,9 x 10 <sup>7</sup> | 15 min | <140    | <140     | >550    |

### Levuricide selon la norme EN 1650 : taux de reduction (Log R = Log N0 - Log Na)

| Germes                              | Temps  | 100% | 94.3% | 0.1% |
|-------------------------------------|--------|------|-------|------|
| Candida albicans ATCC 10231         | 15 min | >4.0 | >4.0  | <3.0 |
| Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 | 15 min | >4.1 | >4.1  | <3.5 |

### Virucide selon la norme EN 14476 + A2 (virus enveloppes)

En 5 min a 20 C. Etude de l'activite virucide / virostatique a l'aide du coronavirus TGEV en condition de salete.

| Produit                       | Dilution | Substance     | Dilution cytotoxique | Log TCID50 a 5 min | Reduction titre viral |
|-------------------------------|----------|---------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| Viral control                 | n.a.     |               | n.a.                 | 7.93               | n.a.                  |
| HAGRAL SPRAY SR RNS Lot 2510B | 100%     | BSA (0.3 g/L) | 10 <sup>-1</sup>     | 2.60               | 5.33                  |
| HAGRAL SPRAY SR RNS Lot 2510B | 80%      | BSA (0.3 g/L) | 10 <sup>-1</sup>     | 2.60               | 5.33                  |

La reduction du titre viral est exprimee sous forme logarithmique.

n.a. : non applicable.

### Levuricide selon la norme EN 13624 sur Candida albicans DSM 1386

En 1 min a 20 C (condition de proprete). Essai proprement-dit (methode par dilution-neutralisation ou filtration sur membrane).

| Susp. ref            | Susp. val. | 0,1% ref             | 0,1% val. | 50% ref              | 50% val. | 80% ref              | 80% val. |
|----------------------|------------|----------------------|-----------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| 10 <sup>5</sup> VC 1 | 208        | 10 <sup>0</sup> VC 1 | >330      | 10 <sup>0</sup> VC 1 | 0        | 10 <sup>0</sup> VC 1 | 0        |
| 10 <sup>5</sup> VC 2 | 214        | 10 <sup>0</sup> VC 2 | >330      | 10 <sup>0</sup> VC 2 | 0        | 10 <sup>0</sup> VC 2 | 0        |
| 10 <sup>6</sup> VC 1 | 21         | 10 <sup>1</sup> VC 1 | >330      | 10 <sup>1</sup> VC 1 | 0        | 10 <sup>1</sup> VC 1 | 0        |
| 10 <sup>6</sup> VC 2 | 23         | 10 <sup>1</sup> VC 2 | >330      | 10 <sup>1</sup> VC 2 | 0        | 10 <sup>1</sup> VC 2 | 0        |
| N                    | 2,1E+07    | Na                   | >3,3E+04  | Na                   | <1,4E+02 | Na                   | <1,4E+02 |
| N0                   | 2,1E+06    | Log Na               | >4,52     | Log Na               | <2,15    | Log Na               | <2,15    |
| Log N0               | 6,33       | Reduction            | <1,81     | Reduction            | >4,18    | Reduction            | >4,18    |

Seuil efficacite : 4.

Criteres de validation :

N compris entre 1,5 x 10<sup>7</sup> et 5,0 x 10<sup>7</sup>.

N (methode modifiee) compris entre 1,5 x 10<sup>8</sup> et 5,0 x 10<sup>8</sup>.

Log N compris entre 7,17 et 7,70.

Log N (methode modifiee) compris entre 8,17 et 8,70.

N0 compris entre 1,5 x 10<sup>6</sup> et 5,0 x 10<sup>6</sup>.

Log N0 compris entre 6,17 et 6,70.

### Bactericide selon la norme EN 13727 sur Enterococcus hirae DSM 3320

Norme medicale. En 30 sec (condition de proprete). Essai proprement-dit (methode par dilution-neutralisation ou filtration sur membrane).

| Susp. ref            | Susp. val. | 0,1% ref             | 0,1% val. | 50% ref              | 50% val. | 80% ref              | 80% val. |
|----------------------|------------|----------------------|-----------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| 10 <sup>6</sup> VC 1 | 159        | 10 <sup>0</sup> VC 1 | >330      | 10 <sup>0</sup> VC 1 | 0        | 10 <sup>0</sup> VC 1 | 0        |
| 10 <sup>6</sup> VC 2 | 176        | 10 <sup>0</sup> VC 2 | >330      | 10 <sup>0</sup> VC 2 | 0        | 10 <sup>0</sup> VC 2 | 0        |

| Susp. ref            | Susp. val. | 0,1% ref             | 0,1% val. | 50% ref              | 50% val. | 80% ref              | 80% val. |
|----------------------|------------|----------------------|-----------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| 10 <sup>7</sup> VC 1 | 18         | 10 <sup>1</sup> VC 1 | >330      | 10 <sup>1</sup> VC 1 | 0        | 10 <sup>1</sup> VC 1 | 0        |
| 10 <sup>7</sup> VC 2 | 18         | 10 <sup>1</sup> VC 2 | >330      | 10 <sup>1</sup> VC 2 | 0        | 10 <sup>1</sup> VC 2 | 0        |
| N                    | 1,7E+08    | Na                   | >3,3E+04  | Na                   | <1,4E+02 | Na                   | <1,4E+02 |
| N0                   | 1,7E+07    | Log Na               | >4,52     | Log Na               | <2,15    | Log Na               | <2,15    |
| Log N0               | 7,23       | Reduction            | <2,71     | Reduction            | >5,08    | Reduction            | >5,08    |

Seuil efficacite : 5.

Criteres de validation :

N compris entre 1,5 x 10<sup>8</sup> et 5,0 x 10<sup>8</sup>.

N (methode modifiee) compris entre 1,5 x 10<sup>9</sup> et 5,0 x 10<sup>9</sup>.

Log N compris entre 8,17 et 8,70.

Log N (methode modifiee) compris entre 9,17 et 9,70.

### Bactericide selon la norme EN 13727 sur Escherichia coli K12 DSM 11250

Norme medicale. En 30 sec (condition de proprete). Essai proprement-dit (methode par dilution-neutralisation ou filtration sur membrane).

| Susp. ref            | Susp. val. | 0,1% ref             | 0,1% val. | 50% ref              | 50% val. | 80% ref              | 80% val. |
|----------------------|------------|----------------------|-----------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| 10 <sup>6</sup> VC 1 | >330       | 10 <sup>0</sup> VC 1 | >330      | 10 <sup>0</sup> VC 1 | 0        | 10 <sup>0</sup> VC 1 | 0        |
| 10 <sup>6</sup> VC 2 | >330       | 10 <sup>0</sup> VC 2 | >330      | 10 <sup>0</sup> VC 2 | 0        | 10 <sup>0</sup> VC 2 | 0        |
| 10 <sup>7</sup> VC 1 | 44         | 10 <sup>1</sup> VC 1 | >330      | 10 <sup>1</sup> VC 1 | 0        | 10 <sup>1</sup> VC 1 | 0        |
| 10 <sup>7</sup> VC 2 | 38         | 10 <sup>1</sup> VC 2 | >330      | 10 <sup>1</sup> VC 2 | 0        | 10 <sup>1</sup> VC 2 | 0        |
| N                    | 4,1E+08    | Na                   | >3,3E+04  | Na                   | <1,4E+02 | Na                   | <1,4E+02 |
| N0                   | 4,1E+07    | Log Na               | >4,52     | Log Na               | <2,15    | Log Na               | <2,15    |
| Log N0               | 7,61       | Reduction            | <3,09     | Reduction            | >5,46    | Reduction            | >5,46    |

Seuil efficacite : 5.

Criteres de validation :

N compris entre 1,5 x 10<sup>8</sup> et 5,0 x 10<sup>8</sup>.

N (methode modifiee) compris entre 1,5 x 10<sup>9</sup> et 5,0 x 10<sup>9</sup>.

Log N compris entre 8,17 et 8,70.

Log N (methode modifiee) compris entre 9,17 et 9,70.

### Bactericide selon la norme EN 13727 sur Pseudomonas aeruginosa DSM 939

Norme medicale. En 30 sec (condition de proprete). Essai proprement-dit (methode par dilution-neutralisation ou filtration sur membrane).

| Susp. ref            | Susp. val. | 0,1% ref             | 0,1% val. | 50% ref              | 50% val. | 80% ref              | 80% val. |
|----------------------|------------|----------------------|-----------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| 10 <sup>6</sup> VC 1 | 187        | 10 <sup>0</sup> VC 1 | >330      | 10 <sup>0</sup> VC 1 | 0        | 10 <sup>0</sup> VC 1 | 0        |
| 10 <sup>6</sup> VC 2 | 199        | 10 <sup>0</sup> VC 2 | >330      | 10 <sup>0</sup> VC 2 | 0        | 10 <sup>0</sup> VC 2 | 0        |
| 10 <sup>7</sup> VC 1 | 17         | 10 <sup>1</sup> VC 1 | >330      | 10 <sup>1</sup> VC 1 | 0        | 10 <sup>1</sup> VC 1 | 0        |
| 10 <sup>7</sup> VC 2 | 12         | 10 <sup>1</sup> VC 2 | >330      | 10 <sup>1</sup> VC 2 | 0        | 10 <sup>1</sup> VC 2 | 0        |
| N                    | 1,9E+08    | Na                   | >3,3E+04  | Na                   | <1,4E+02 | Na                   | <1,4E+02 |
| N0                   | 1,9E+07    | Log Na               | >4,52     | Log Na               | <2,15    | Log Na               | <2,15    |
| Log N0               | 7,28       | Reduction            | <2,76     | Reduction            | >5,13    | Reduction            | >5,13    |

Seuil efficacite : 5.

Criteres de validation :

N compris entre 1,5 x 10<sup>8</sup> et 5,0 x 10<sup>8</sup>.

N (methode modifiee) compris entre 1,5 x 10<sup>9</sup> et 5,0 x 10<sup>9</sup>.

Log N compris entre 8,17 et 8,70.

Log N (methode modifiee) compris entre 9,17 et 9,70.

### Bactericide selon la norme EN 13727 sur Staphylococcus aureus DSM 799

Norme medicale. En 30 sec (condition de proprete). Essai proprement-dit (methode par dilution-neutralisation ou filtration sur membrane).

| Susp. ref            | Susp. val. | 0,1% ref             | 0,1% val. | 50% ref              | 50% val. | 80% ref              | 80% val. |
|----------------------|------------|----------------------|-----------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| 10 <sup>6</sup> VC 1 | 186        | 10 <sup>0</sup> VC 1 | >330      | 10 <sup>0</sup> VC 1 | 0        | 10 <sup>0</sup> VC 1 | 0        |
| 10 <sup>6</sup> VC 2 | 174        | 10 <sup>0</sup> VC 2 | >330      | 10 <sup>0</sup> VC 2 | 0        | 10 <sup>0</sup> VC 2 | 0        |
| 10 <sup>7</sup> VC 1 | 18         | 10 <sup>1</sup> VC 1 | >330      | 10 <sup>1</sup> VC 1 | 0        | 10 <sup>1</sup> VC 1 | 0        |
| 10 <sup>7</sup> VC 2 | 16         | 10 <sup>1</sup> VC 2 | >330      | 10 <sup>1</sup> VC 2 | 0        | 10 <sup>1</sup> VC 2 | 0        |
| N                    | 1,8E+08    | Na                   | >3,3E+04  | Na                   | <1,4E+02 | Na                   | <1,4E+02 |
| N0                   | 1,8E+07    | Log Na               | >4,52     | Log Na               | <2,15    | Log Na               | <2,15    |
| Log N0               | 7,25       | Reduction            | <2,73     | Reduction            | >5,1     | Reduction            | >5,1     |

Seuil efficacite : 5.

Criteres de validation :

N compris entre 1,5 x 10<sup>8</sup> et 5,0 x 10<sup>8</sup>.

N (methode modifiee) compris entre 1,5 x 10<sup>9</sup> et 5,0 x 10<sup>9</sup>.



Log N compris entre 8,17 et 8,70.

Log N (methode modifiee) compris entre 9,17 et 9,70.

### Bactericide selon la norme EN 13697

En 5 min a 20 C (condition de proprete). Concentration du produit : 100%.

| Germes                            | Temps | Dilution 10^0 | Dilution 10^-1 | Dilution 10^-2 | Nd    | Nts  | Effet microbicide |
|-----------------------------------|-------|---------------|----------------|----------------|-------|------|-------------------|
| Staphylococcus aureus ATCC 6538   | 5     | <14/<14       | <14/<14        | <14/<14        | <2.15 | <100 | >5.1              |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 | 5     | <14/<14       | <14/<14        | <14/<14        | <2.15 | <100 | >4.7              |
| Escherichia coli ATCC 10536       | 5     | <14/<14       | <14/<14        | <14/<14        | <2.15 | <100 | >4.6              |
| Enterococcus hirae ATCC 10541     | 5     | <14/<14       | <14/<14        | <14/<14        | <2.15 | <100 | >4.9              |

TP 01 : Produits biocides destines a l'hygiene humaine.

TP 02 : Desinfectants pour les surfaces qui ne sont pas en contact avec les denrees alimentaires et les aliments pour animaux.

TP 04 : Desinfectant pour le domaine public et pour les surfaces en contact avec les denrees alimentaires et les aliments pour animaux.

Substances actives : Ethanol (N CAS : 64-17-5).

DLU : 2 ans a partir de la date de fabrication.